



维根生物科技有限公司

Vigen Biotechnology (Zhenjiang) Co., Ltd

VigenCell®

Tel: 183 628 99236

E-mail: 253540644@qq.com

SW480 细胞株说明书

一、基本信息

| | | | |
|-------|--|------|------------------------|
| 产品名称 | SW480 | 产品货号 | VGC-0020-0000 |
| 中文名称 | 人结肠腺癌细胞 | 细胞规格 | 1 × 10 ⁶ 细胞 |
| 细胞形态 | 上皮细胞样 | 生长特性 | 贴壁生长 |
| 完全培养基 | L15 + 10% FBS | | |
| 培养条件 | (1) 气相: 100% 空气; (2) 温度: 37 °C。 | | |
| 细胞冻存 | 无血清冻存液 (VGA-0046-0100) | 存储条件 | 液氮 |
| 传代方法 | 建议 1: 2 ~ 1: 3 传代, 每 2 ~ 3 天传代或换液 1 次。 | | |
| 运输条件 | 活细胞常温运输或冻存细胞干冰运输。 | | |

二、细胞到货处理

1、常温寄送的活细胞

1.1 T25 细胞培养瓶寄送活细胞的处理方法 (细胞处于完全培养基中):

a) 观察细胞培养瓶是否完好、培养基是否有漏液、浑浊等现象。若有, 请拍照并及时与技术支持联系。

b) 用 75%酒精擦拭细胞培养瓶表面, 显微镜下观察细胞状态。若因运输导致部分贴壁细胞从瓶壁脱落, 先不要打开培养瓶盖, 将培养瓶置于细胞培养箱内静置 2~4 h, 以便稳定细胞状态。

c) 静置完成后取出细胞培养瓶, 镜检、拍照、记录细胞状态, 如有异常现象, 例如污染、细胞状态差等, 请拍照留证并及时与技术支持联系。

d) 在生物安全柜中将细胞培养瓶中大部分培养基吸出, 仅留适量用于细胞培养, 然后将细胞置于 37 °C, 5% CO₂ 培养箱培养。

e) 根据细胞生长习性及时换液、传代、冻存细胞。





维根生物科技有限公司

Vigen Biotechnology (Zhenjiang) Co., Ltd

VigenCell®

Tel: 183 628 99236

E-mail: 253540644@qq.com

1.2 冻存管寄送的活细胞处理方法（细胞处于全血清中）：

- a) 用 75%酒精彻底消毒细胞冻存管，然后在生物安全柜中将细胞悬液转移至 15 mL 无菌离心管，500 g，室温离心 5 min。
- b) 弃血清，用完全培养基重悬细胞沉淀。
- c) 细胞接种于细胞培养皿或培养瓶，然后置于 37 °C，5% CO₂ 培养箱培养。
- d) 次日观察细胞形态，如有异常现象，例如污染、细胞状态差等，请拍照留证并及时与技术支持联系。
- e) 根据细胞习性及时换液、传代、冻存细胞。

2、干冰寄送的冻存细胞（细胞处于无血清细胞冻存液中）

- a) 将细胞冻存管从干冰中取出后立即置于 37 °C 水浴，轻轻晃动冻存管，直至管内细胞完全融化（最好在 1~2 min 内解冻）。
- b) 用 75% 酒精彻底消毒冻存管后将其转移至生物安全柜。
- c) 将解冻细胞转移到 15 mL 无菌离心管，然后 500 g，室温离心 5 min。
- d) 弃细胞冻存液，用完全培养基重悬细胞沉淀。
- e) 将细胞接种于合适的细胞培养皿或培养瓶，然后置于 37 °C，5% CO₂ 培养箱培养。次日观察细胞形态，如有异常现象，例如污染、细胞状态差等，请拍照留证并及时与技术支持联系。
- f) 根据细胞习性及时换液、传代、冻存细胞。

三、细胞培养

1、细胞复苏：

- a) 将冻存细胞在 37 °C 水浴中快速摇晃至完全溶解；
- b) 在生物安全柜中将细胞转移至 15 mL 无菌离心管，加入 4 mL 培养基或无菌 PBS 混合均匀，室温，500 g，离心 5 min；
- c) 在生物安全柜中吸掉上清液，然后用完全培养基重悬细胞沉淀，将细胞接种于细胞培养瓶或细胞培养皿，然后将其置于 37 °C，5% CO₂ 培养箱培养。





维根生物科技有限公司

Vigen Biotechnology (Zhenjiang) Co., Ltd

VigenCell®

Tel: 183 628 99236

E-mail: 253540644@qq.com

2、细胞传代

2.1 贴壁细胞传代：当细胞汇合度达到 80~90%时，可进行细胞传代：

a) 吸出原培养皿或培养瓶中的培养基，PBS 缓冲液润洗细胞 1~2 次，弃 PBS 后加入 1~2 mL 胰蛋白酶消化液（注意根据实际情况加入适量消化液并把握细胞消化时间）。

b) 显微镜下观察细胞消化情况，当细胞边缘缩小，贴壁松动时可用细胞消化液轻轻吹打细胞层至其完全脱落，然后立刻加入 3~4 mL 完全培养基，继续轻轻吹打细胞至单细胞悬液。

c) 将细胞悬液转移至 15 mL 无菌离心管，500 g，室温离心 5 min。

d) 在生物安全柜弃上清，然后用适量完全培养基重悬细胞沉淀，将细胞悬液接种于新的细胞培养皿或细胞培养瓶，置于 37 °C，5% CO₂ 培养箱培养。

2.2 悬浮细胞传代：当细胞密度约 80%时，可进行传代培养：

a) 直接将原培养基和细胞一起转移至 15 mL 或 50 mL 无菌离心管，400~500 g 室温离心 5 min，吸掉培养基，用新鲜完全培养基重悬细胞。

b) 根据细胞生长特性，按合适比例传代细胞，将细胞悬液转移至新的培养皿或培养瓶，将细胞置于 37 °C 培养箱中培养。

3、细胞冻存：收集细胞，500 g，离心 5 min，弃上清液，加入无血清冻存液（VGA-0046-100）轻轻重悬细胞，移入冻存管后进行冻存。

四、使用须知

- 1) 本产品仅供购买方单方使用，不得向任何第三方赠送、转让或销售；
- 2) 本产品仅供实验室和体外研究使用，不能用于任何临床检验、诊断、治疗，或任何非法用途；
- 3) 收货 48 h 内如若发现异常，请及时联系售后，逾期视为收货良好；
- 4) 请严格按照本说明书操作，否则造成细胞失活等情形，不予提供补发服务。



www.vigenbio.com



Technical Support