



维根生物科技有限公司  
Vigen Biotechnology (Zhenjiang) Co., Ltd


VigenCell®

Tel: 183 628 99236  
E-mail: 253540644@qq.com

## Jurkat(E6)-NFAT-ffluc report cell line 单克隆株

### 一、基本信息

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 产品货号  | VGC-0010-R102S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 产品描述  | <p><b>Jurkat(E6)-NFAT-ffluc</b> 单克隆细胞株是通过基因编辑技术在人 Jurkat T 淋巴细胞中稳定整合 NFAT (Nuclear Factor of Activated T Cells) 响应元件驱动的萤火虫荧光素酶 (ffluc) 报告系统构建而成。该细胞株能够在 NFAT 信号通路激活时 (如 T 细胞受体刺激) 高效表达 ffluc, 为研究 T 细胞活化、免疫调节及药物筛选提供可视化工具。</p> <p><b>Jurkat(E6)细胞:</b> Jurkat 源自人 T 淋巴细胞白血病, E6 是 Jurkat 的一个亚克隆, Jurkat 细胞广泛应用于 T 细胞信号转导、免疫应答及药物筛选研究。</p> <p><b>NFAT-ffluc 系统:</b> NFAT 响应元件与最小启动子结合驱动 ffluc 表达, 能够灵敏反映细胞内钙离子信号 (如 TCR 激活、钙调磷酸酶通路) 的动态变化。</p> |
| 应用场景  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TCR/CD3 复合体激活研究</li> <li>• 免疫抑制剂 (如环孢素 A、FK506) 作用机制分析</li> <li>• 自身免疫疾病或肿瘤免疫治疗的体外模型构建</li> <li>• 药物高通量筛选 (ffluc 信号可定量)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 细胞形态  | 淋巴母细胞样, 悬浮生长                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 细胞规格  | 1 × 10 <sup>6</sup> 细胞冻存细胞或 T12.5 细胞瓶细胞                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 完全培养基 | RPMI-1640 + 10% FBS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 培养条件  | (1) 气相: 95%空气, 5% CO <sub>2</sub> ; (2) 温度: 37 °C。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 传代方法  | 1: 2 传代, 2~3 天换液一次。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 细胞冻存  | 无血清冻存液 (VGA-0046-0100) ; -80°C短期保存; 液氮长期保存                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 运输条件  | 活细胞常温运输或冻存细胞干冰运输                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 备注信息  | 如混合稳转细胞株带抗性基因, 建议每传 8~10 代用相应抗性药物筛选一次; 或在细胞培养过程中添加适当浓度的抗性药物以维持细胞株阳性率。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



www.vigenbio.com



Technical Support



## 二、细胞到货处理

### 1、常温到货细胞

#### 1.1 细胞培养瓶寄送活细胞（细胞处于培养液中）的处理方法：

- a) 观察细胞培养瓶是否完好，培养液是否有漏液、浑浊等现象。若有，请拍照，并及时与技术支持联系。
- b) 用 75%酒精擦拭细胞培养瓶表面，显微镜下观察细胞状态。若因运输问题，部分贴壁细胞从瓶壁脱落,先不要打开培养瓶盖，将细胞置于细胞培养箱内静置培养 2~4 小时，以便稳定细胞状态。
- c) 静置完成后，取出细胞培养瓶，镜检、拍照，记录细胞状态，如有异常现象，例如污染，细胞状态差等，请拍照留证并及时与技术支持联系。
- d) 仅留适量细胞培养液（弃去多余），然后将细胞置于 37 °C，5% CO<sub>2</sub> 培养箱培养。
- e) 根据细胞习性及时换液、传代、冻存细胞。

#### 1.2 冻存管寄送活细胞（细胞处于全血清中）的处理方法：

- a) 用 75%酒精彻底消毒细胞冻存管，然后在超净工作台将细胞悬液转移至 15 mL 无菌离心管，500 g，室温离心 5 min。
- b) 弃血清，用完全培养基重悬细胞沉淀。
- c) 细胞接种于合适的细胞培养皿或培养瓶，然后置于 37 °C，5%CO<sub>2</sub> 培养箱培养。
- d) 次日观察细胞形态，如有异常现象，例如污染，细胞状态差等，请拍照留证并及时与技术支持联系。
- e) 根据细胞习性及时换液、传代、冻存细胞。

### 2、干冰运输细胞

- a) 将细胞从干冰中取出后立即置于 37 °C 水浴，轻轻转动冻存管，直至管内细胞完全融化（最好在 1~2 min 内解冻）。
- b) 将冻存管转移到超净工作台，用 75% 酒精彻底消毒冻存管。





- c) 将解冻细胞转移到 15 mL 无菌离心管，500 g，室温离心 5 min。
- d) 弃细胞冻存液，用完全培养基重悬细胞沉淀。
- e) 将细胞接种于合适的细胞培养皿或培养瓶，然后置于 37 °C，5% CO<sub>2</sub> 培养箱培养。次日观察细胞形态，如有异常现象，例如污染，细胞状态差等，请拍照留证并及时与技术支持联系。
- f) 根据细胞习性及时换液、传代、冻存细胞。

### 三、细胞培养

#### 1、细胞复苏

将含有 1 mL 细胞悬液的冻存管在 37 °C 水浴中快速摇晃至溶解，然后在超净工作台将细胞转移至 15 mL 无菌离心管，加入 4 mL 培养基或无菌 PBS 混合均匀，室温，500 g，离心 5 min，弃上清液，用完全培养基重悬细胞，将细胞移入培养瓶或培养皿培养，第二天更换培养液并检查细胞生长情况。

#### 2、细胞传代

2.1 贴壁细胞传代：当细胞密度约 80% 时，可进行传代培养：

- a) 吸出原培养皿中的培养基，PBS 缓冲液润洗细胞两次，加 2 ~ 3 mL 0.25% 胰酶进行消化（注意根据实际情况，把握消化时间）。
- b) 镜下观察消化情况，在细胞边缘缩小，贴壁松动时（可用吸管吸起些许胰酶轻轻吹打细胞层某处，即可肉眼可见细胞层脱落，或吹打后镜下观察吹打处，即消化完成，否则继续消化）直接吸掉胰酶，加 3 ~ 4 mL 完全培养基，轻轻吹打细胞层，把细胞层吹落，吹散。
- c) 取部分细胞悬液转移至新的培养皿中，添加适当的完全培养基，把细胞悬液打匀，于培养箱中培养。

2.2 悬浮细胞传代：当细胞密度约 80% 时，可进行传代培养：

- a) 直接将原培养液和细胞一起转移至 15 mL 或 50 mL 无菌离心管，400 ~ 500 g 室温离心 5 min，吸掉培养基，用新鲜完全培养基重悬细胞。





维根生物科技有限公司  
Vigen Biotechnology (Zhenjiang) Co., Ltd

VigenCell®

Tel: 183 628 99236  
E-mail: 253540644@qq.com

b) 根据细胞生长特性，按合适比例传代细胞，将细胞悬液转移至新的培养皿或培养瓶，将细胞置于 37°C 培养箱中培养。

### 3、细胞冻存

收集细胞，500 g，离心 5 min，弃上清液，加入无血清冻存液（VGA-0046-0100）轻轻悬浮细胞，移入冻存管后进行冻存。

## 四、NFAT 信号激活与 ffluc 检测

### 激活方法：

化学诱导：PMA（50 ng/mL）+ 离子霉素（1 μM）处理 4 ~ 6 小时；

或 ConA（1 μg/mL）处理 10 ~ 12 小时。

抗体刺激：抗 CD3/CD28 抗体包被培养板（终浓度 1 μg/mL），细胞培养过夜。

### ffluc 检测：

加底物后利用多功能酶标仪检测 ffluc 信号值。

## 五、使用须知

- 1) 本产品仅供购买方单方使用，不得向任何第三方赠送、转让或销售；
- 2) 本产品仅供实验室和体外研究使用，不能用于任何临床检验、诊断、治疗，或任何非法用途；
- 3) 收货 48 h 内如若发现异常，请及时联系售后，逾期视为收货良好；
- 4) 请严格按照本说明书操作，否则造成细胞失活等情形，不予提供补发服务。

## 六、细胞株质检



www.vigenbio.com




Technical Support



维根生物科技有限公司  
Vigen Biotechnology (Zhenjiang) Co., Ltd

VigenCell®

Tel: 183 628 99236  
E-mail: 253540644@qq.com



www.vigenbio.com



Technical Support